

Bioblitz

— Elvar, Fannar og Stefán —

Svartpröstur (Turdidae)

Svartpröstur er að
þratarætt. Fullorðinn karlfuglinn er
alsvartur að lit með gulan
gogg. Kvenfuglar eru dökkbrúnir
aðeins ljósari að neðan, kverkin
ljósust. Rákir á bringur og brjósti.



Stokkendur

(*Anas platyrhynchos*)

Stokkendur eru 50-65 cm á lengd og 1.100 g á þyngd. Karkins stökkönd kallast steggur og grænhöfðinn, er með glansandi dökkgrænt höfuð. Kollan er kvenkynsönd er brúnflikrótt, með ljósara höfuð og bringu.



Skarnfluga (*Hydrotaea dentipes*)

Víða um heim, þekkt í öllum heimsálfum nema Ástralíu og hitabeltislöndum Afríku.

Á Ísland um allt land og algeng á láglendi en síður á miðhálandinu.



Köttur (*Felis silvestris catus*)

Köttur er sem er tegund
lítilla rándýra af ætt
kattardýra. Karlkyns
köttur heitir Högni eða
fress. kvenkynsköttur
heitir Læða eða bleyða og
afkvæmin kettlingar.



Alaskalúpína(*Lupinus nootkatensis*)

Alaskalúpína er 30 til 90 sentimetra há. Hún ber blá eða fjólublá blóm. Alaskalúpínan er að ertublómaætt. Alaskalúpína hefur lengi verið notuð í landgræðslu á Íslandi.



Holtasóley (Dyras octopetala)

Flokkur Holtasóleyja er Jurtir og fjölæringar. Holtasóley er íslensk planta. Blómgunartími er frá Júní til júlí. Hæðin getur verið allt að 10-20 cm.



Túnfífill (*Taraxacum* *ssp*)

Blómplanta og fífiltegund af körfublómaætt. Hann er algengur á Íslandi og getur vaxið upp í 1000 m hæð yfir sjávarmáli. Hann skiptist í nokkrar tegundir.



Njóli

(*Rumex longifolius*)

.Ætt njólans er súruætt.Njólihefur flust til Íslands af mannavöldum og vex í dag einkum í kaптúnum og við sveitabæi.Njólinn var notaður sem lækningajurt og fersk njólablöð talin holl.Njóli er metri á hæð.

